

Para personas con síndrome de Bardet-Biedl (SBB)



Retratos de actores.

Descubra un mundo más allá de la obesidad

**IMCIVREE**<sup>®</sup>  
(setmelanotide) injection

**El primer y único tratamiento aprobado por la FDA** para tratar una vía del MC4R alterada, la causa del apetito y de la obesidad en personas con SBB.

MC4R=receptor de melanocortina-4.

¿Qué es IMCIVREE?

IMCIVREE es un medicamento recetado que se utiliza en adultos y niños mayores de 6 años con obesidad debido al síndrome de Bardet-Biedl (SBB) para ayudarlos a perder peso y mantenerlo.

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluidas la [Información para el paciente](#) y la Información importante de seguridad.





Retratos de actores.

### ¿Qué es IMCIVREE?

IMCIVREE es un medicamento recetado que se utiliza en adultos y niños mayores de 6 años con obesidad debido al síndrome de Bardet-Biedl (SBB) para ayudarlos a perder peso y mantenerlo.

IMCIVREE no se debe usar en personas con las siguientes afecciones porque es posible que no funcione:

- ◆ Otros tipos de obesidad no relacionados con el SBB u otros usos de IMCIVREE aprobados por la FDA, incluida la obesidad asociada con otras afecciones genéticas y obesidad general

No se sabe si IMCIVREE es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

No use IMCIVREE si ha tenido una reacción alérgica grave a este medicamento o a alguno de sus ingredientes. Pueden producirse reacciones alérgicas graves, incluida anafilaxia.

# Índice


---

- ◆ ¿Qué es el SBB? ..... 4
- ◆ ¿Cuál es la causa del apetito y la obesidad en el SBB?..... 6
- ◆ ¿Cómo funciona IMCIVREE? ..... 8
- ◆ ¿Cómo se estudió IMCIVREE? ..... 9
- ◆ ¿De qué forma IMCIVREE puede ayudar a reducir el peso en niños?..... 10
- ◆ ¿De qué forma IMCIVREE puede ayudar a reducir el peso en adultos?..... 14
- ◆ ¿De qué forma IMCIVREE puede ayudar con la reducción del hambre en el ensayo clínico?..... 16
- ◆ ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IMCIVREE? ..... 18
- ◆ ¿Cómo se administra IMCIVREE?..... 20
- ◆ Comenzando con IMCIVREE..... 22
- ◆ Rhythm InTune: Apoyo personalizado..... 24

# ¿Qué es el SBB?

El síndrome de Bardet-Biedl, también conocido como SBB, es una enfermedad genética rara.

El SBB tiene una amplia gama de síntomas.



El SBB es hereditario. Puede transmitirse de padre o madre a hijo si ambos padres tienen variantes o cambios en un gen del SBB.

**Las personas con SBB pueden sentir hambre intensa y difícil de controlar. Esta sensación no es su culpa. Los cambios en los genes del SBB pueden impedir que funcione correctamente un área clave del cerebro que controla el hambre.**



El área clave del cerebro que se comunica con el hambre o la saciedad se conoce como el hipotálamo.

Considere que el hipotálamo es como un vecindario dentro del cerebro.



Hipotálamo



En este vecindario, hay rutas que permiten que los camiones viajen hacia y desde el cerebro. Un camino se llama vía del receptor de melanocortina-4, o MC4R.




Los camiones en esta ruta envían mensajes entre el cuerpo y el cerebro. Estos mensajes controlan el hambre.



En esta ruta, hay un semáforo, o gen del SBB, que guía a los camiones para que entreguen sus mensajes.

# ¿Qué causa el hambre y la obesidad en el SBB?

En las personas con SBB, las señales que desactivan el hambre no funcionan correctamente en el cerebro.



Cuando el gen del SBB es normal, sin una variante (o cambio), el semáforo funciona correctamente. La ruta (vía del MC4R) está abierta y los camiones pueden entregar mensajes al cerebro de que el cuerpo está satisfecho y no necesita más alimento.

## ¿Qué es IMCIVREE?

IMCIVREE es un medicamento recetado que se utiliza en adultos y niños mayores de 6 años con obesidad debido al síndrome de Bardet-Biedl (SBB) para ayudarlos a perder peso y mantenerlo.

IMCIVREE no se debe usar en personas con las siguientes afecciones porque es posible que no funcione:

- ◆ Otros tipos de obesidad no relacionados con el SBB u otros usos de IMCIVREE aprobados por la FDA, incluida la obesidad asociada con otras afecciones genéticas y obesidad general

No se sabe si IMCIVREE es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

No use IMCIVREE si ha tenido una reacción alérgica grave a este medicamento o a alguno de sus ingredientes. Pueden producirse reacciones alérgicas graves, incluida anafilaxia.

**IMCIVREE**<sup>®</sup>  
(setmelanotide) injection

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluidas la [Información para el paciente](#) y la [Información importante de seguridad](#).



En personas con SBB, el semáforo no funciona debido al cambio en el gen del SBB.



Cuando el gen del SBB tiene una variante (o cambio), el semáforo no funciona, lo que causa un embotellamiento de tránsito. Los camiones ya no pueden viajar por la ruta (vía del MC4R) para entregar correctamente los mensajes al cerebro indicando que el cuerpo está satisfecho y no necesita más alimento. En cambio, el cuerpo cree que todavía tiene hambre.

**IMCIVREE es el primer y único tratamiento para tratar una vía del MC4R alterada, la causa del hambre y de la obesidad en personas con SBB.**

# ¿Cómo funciona IMCIVREE?

IMCIVREE está diseñado para restablecer la función de la “ruta” (vía del MC4R), de modo que los camiones puedan enviar mensajes al cerebro indicando que el cuerpo está satisfecho.



IMCIVREE es como un oficial de tránsito. Cuando el semáforo no funciona, el oficial de tránsito dirige los camiones en la ruta (vía del MC4R), permitiéndoles transmitir mensajes al cerebro de que el cuerpo está satisfecho y no necesita más alimento.

Así es como funciona IMCIVREE para ayudar a que la vía funcione adecuadamente.

## Información importante de seguridad (cont.)

Antes de usar IMCIVREE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso lo siguiente:

- ◆ Tiene o ha tenido áreas de piel oscurecida, incluida decoloración de la piel (hiperpigmentación).
- ◆ Tiene o ha tenido depresión o pensamientos o conductas suicidas.
- ◆ Tiene problemas de riñón.
- ◆ Está embarazada o planea quedar embarazada. Si baja de peso durante el embarazo, puede causarle daño a su bebé en gestación. Su proveedor de atención médica puede detener su tratamiento con IMCIVREE si queda embarazada. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con IMCIVREE.



# ¿Cómo se estudió IMCIVREE?


**IMCIVREE se estudió en niños y adultos en un ensayo clínico de un año de duración.**

El ensayo clínico fue el más grande para evaluar la reducción del peso y el apetito en personas con SBB.

- ◆ 31 personas fueron evaluadas en el ensayo clínico.
  - Todas las personas tenían más de 6 años, obesidad y un diagnóstico clínico de SBB.
- ◆ Los niños y adultos incluidos en el ensayo clínico debían tener un determinado peso o índice de masa corporal (IMC). El IMC es una medida de la grasa corporal basada en la estatura y el peso.
  - Los niños debían tener un peso en el percentil 97 o superior.
  - Los adultos debían tener un IMC de 30 o más.

**IMCIVREE redujo el IMC en el transcurso del ensayo clínico de 1 año.**

- ◆ Reducción promedio de aproximadamente 8 % en el IMC en personas mayores de 6 años.



**Las personas que recibieron IMCIVREE tuvieron mejoras generales en otras áreas.**

La presión arterial, los lípidos y la circunferencia de la cintura mejoraron con IMCIVREE. Debido a la cantidad limitada de personas estudiadas y a la falta de un grupo de control en el estudio, estos efectos del tratamiento no pudieron medirse con exactitud.

# ¿De qué forma IMCIVREE puede ayudar con la reducción de peso en los niños?\*

IMCIVREE redujo los puntajes Z del IMC en el transcurso del ensayo clínico de 1 año.

Se utilizó un puntaje Z de IMC para medir la reducción del IMC en niños. Los puntajes Z del IMC son medidas confiables del peso en niños que aún están creciendo porque tienen en cuenta la estatura, la edad y el sexo.

**86 %**

de los niños tuvo una reducción significativa en el puntaje Z del IMC.†

En el ensayo clínico, no fue necesario que las personas cambiaran su dieta ni rutina de ejercicio.

**IMCIVREE es el primer y único tratamiento para reducir significativamente el puntaje Z del IMC en niños con obesidad y un diagnóstico clínico de SBB.**

\*N=14. N es la cantidad de personas evaluadas. Los niños tenían entre 6 y 17 años.

†Una reducción clínicamente significativa generalmente se define como una reducción mayor o igual que 0.2 en el puntaje Z del IMC.

## Información importante de seguridad (cont.)

Antes de usar IMCIVREE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso lo siguiente: (cont.)

- ◆ Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si IMCIVREE pasa a la leche materna. No debe amamantar durante el tratamiento con IMCIVREE.

**IMCIVREE**<sup>®</sup>  
(setmelanotide) injection

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluidas la [Información para el paciente](#) y la **Información importante de seguridad**.



## En un estudio a largo plazo, los niños que continuaron recibiendo IMCIVREE mantuvieron las reducciones en los puntajes Z del IMC.‡

Algunas personas decidieron continuar recibiendo IMCIVREE en un ensayo clínico separado a largo plazo. Después de recibir 2 años de tratamiento, se analizaron sus resultados.

**100 %**

de los pacientes a los 2 años tuvo una reducción significativa en el puntaje Z del IMC.†§

◆ Hubo una reducción de 0.72 en el puntaje Z del IMC.†

Los niños que continuaron con IMCIVREE durante 2 años mantuvieron reducciones significativas en el puntaje Z del IMC

**Pesa mucho menos y ya no batalla para cargar ese peso**

— Cuidador de un niño que recibe IMCIVREE




‡No se pudo calcular el cambio en el puntaje Z del IMC para un paciente de 20 años que tenía 17 años al comienzo del ensayo original.

§N=12

# IMCIVREE redujo la gravedad de la obesidad en niños con SBB.

Es posible que esté más familiarizado con la imagen del crecimiento de un niño como percentil en un gráfico del médico. Estos mismos gráficos se pueden usar para el IMC.



Este gráfico de crecimiento representa la reducción del IMC que una niña\* de 12 años con SBB que recibe IMCIVREE puede tener después de 1 año, en función de los resultados del estudio clínico.

- ◆ Al inicio del ensayo clínico, el IMC promedio fue del 145 % del percentil 95.
- ◆ Al inicio del ensayo clínico, el IMC promedio fue del 127 % del percentil 95.
- Reducción de 17 puntos porcentuales

## Información importante de seguridad (cont.)

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Consulte las Instrucciones de uso detalladas que vienen con IMCIVREE para aprender cómo preparar e inyectar IMCIVREE y cómo desechar (eliminar) correctamente las jeringas y agujas usadas.




Figura modelada según Gulati AK, Kaplan DW, Daniels SR. Seguimiento clínico de niños gravemente obesos: un nuevo gráfico de crecimiento. Pacientes pediátricos. Diciembre de 2012;130(6):1136-40

El gráfico anterior no representa la trayectoria real de peso de un paciente.


\*No es un paciente real.

El gráfico de crecimiento se basa en mujeres de 2 a 20 años y tiene fines ilustrativos únicamente.

# ¿Cómo es que IMCIVREE puede ayudar a reducir el peso en adultos?\*

IMCIVREE mostró una reducción temprana, significativa y continua del peso.

Reducciones promedio en el peso durante el transcurso del ensayo clínico de 1 año<sup>†</sup>



En el ensayo clínico, no fue necesario que las personas cambiaran su dieta ni rutina de ejercicio.

\*Los adultos tenían más de 18 años.

<sup>†</sup>14 semanas: N=10, 1 año: N=12.

## Información importante de seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IMCIVREE?

IMCIVREE puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

- ◆ Problemas de la función sexual masculina y femenina. IMCIVREE puede causar una erección que ocurre sin ninguna actividad sexual en hombres (erección espontánea del pene) y reacciones sexuales no deseadas (cambios en la excitación sexual que se producen sin ninguna actividad sexual) en mujeres. Si tiene una erección que dura más de 4 horas, procure ayuda médica de emergencia inmediatamente.

**IMCIVREE**<sup>®</sup>  
(setmelanotide) injection

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluidas la [Información para el paciente](#) y la [Información importante de seguridad](#).



En un estudio a largo plazo, los adultos que continuaron recibiendo IMCIVREE durante un total de 2 años bajaron aún más de peso.

Reducción promedio del peso a los 2 años en el estudio a largo plazo<sup>‡</sup>



Al final de un ensayo clínico de IMCIVREE, 19 personas continuaron en un estudio a largo plazo. De estas personas, 6 eran adultos. Las personas son evaluadas cada 3 meses hasta el final del estudio (hasta 5 años o hasta el retiro del estudio).

IMCIVREE me ha ayudado principalmente a bajar y controlar el peso. Sé que no podría haberlo logrado sin este medicamento.

— Paciente adulto inscrito en el ensayo clínico IMCIVREE


IMCIVREE redujo el peso en forma temprana y continua durante los 2 años de tratamiento.

# ¿De qué forma IMCIVREE redujo el hambre en el ensayo clínico?

IMCIVREE proporcionó una reducción en los puntajes de hambre de forma temprana y continua durante todo el tratamiento.

El efecto de IMCIVREE en la reducción del hambre se estudió en personas mayores de 12 años con SBB y que podían informar por sí mismos el hambre.

- ◆ Completaron un cuestionario todos los días durante 1 año para determinar los cambios en el hambre.
- ◆ Las personas calificaron su apetito diariamente usando una escala de 0 a 10.




## Información importante de seguridad (cont.)

IMCIVREE puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes: (cont.)

- ◆ **Depresión y pensamientos o acciones suicidas.** Usted o un cuidador deben llamar a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de depresión, pensamientos o conductas suicidas, o algún cambio inusual en el estado de ánimo o la conducta que sea nuevo o que empeore

# IMCIVREE redujo las sensaciones más intensas de hambre.



La mayoría de las personas tuvo una reducción en el puntaje de hambre dentro de las 2 semanas de recibir IMCIVREE.

Antes de IMCIVREE, no me daba cuenta de cuánto tiempo dedicaba a centrarme en la comida, y de lo mucho que eso estaba afectando a mi día a día y a las otras cosas que podría estar logrando.

— Kathryn, que tiene SBB



# ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IMCIVREE?

IMCIVREE fue bien estudiado y la mayoría de los efectos secundarios fueron generalmente leves y mejoraron con el tiempo.

La seguridad de IMCIVREE se ha evaluado durante aproximadamente 10 años de ensayos clínicos.

Los efectos secundarios más frecuentes en personas con obesidad y un diagnóstico clínico de SBB incluyeron los siguientes:

- ◆ Oscurecimiento de la piel (hiperpigmentación) (63 %)
- ◆ Reacciones en el lugar de inyección (51 %)
- ◆ Náuseas (26 %)
- ◆ Erección que ocurre sin actividad sexual en hombres (25 %)
- ◆ Vómitos (19 %)
- ◆ Diarrea (14 %)
- ◆ Dolor de cabeza (7 %)
- ◆ Estrías (7 %)
- ◆ Agresividad (5 %)
- ◆ Fatiga (5 %)

La mayoría de los episodios de náuseas y vómitos fueron leves, y ninguno fue grave. Las náuseas y los vómitos principalmente se informaron en el primer mes de tratamiento y luego disminuyeron de manera considerable. Estos síntomas por lo general duraron solo unos pocos días.

No se informaron efectos secundarios graves relacionados con IMCIVREE en el ensayo SBB.

Comuníquese con su médico si tiene efectos secundarios.



**El oscurecimiento general de la piel (hiperpigmentación) fue frecuente y rara vez se debió interrumpir el tratamiento por esta causa.**




- ◆ **IMCIVREE también puede aumentar la producción de melanina (que le da color a la piel).**
  - Esto generalmente ocurre dentro del primer mes de iniciar IMCIVREE
  - El oscurecimiento de la piel puede variar.
- ◆ **IMCIVREE puede causar oscurecimiento de los crecimientos existentes de la piel, como los lunares.**
- ◆ **Debe realizarse un examen de piel de cuerpo entero antes de empezar el tratamiento con IMCIVREE y durante este, para detectar cambios en la piel.**
- ◆ **Los cambios en el color de la piel desaparecieron cuando se interrumpió el tratamiento con IMCIVREE.**

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IMCIVREE. Revise todos los posibles efectos secundarios de IMCIVREE en la Información para el paciente adjunta y hable con su médico sobre cualquier pregunta que pueda tener.

# ¿Cómo se administra IMCIVREE?

IMCIVREE es una inyección administrada una vez al día que se utiliza para ayudar a reducir el peso en personas con SBB.


IMCIVREE se administra de la siguiente forma:



Como inyección debajo de la piel



Una vez al día al comienzo del día. Se puede administrar en el hogar.



Con o sin alimentos


## Información importante de seguridad (cont.)

IMCIVREE puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

- ◆ **Reacciones alérgicas graves.** Deje de usar IMCIVREE y obtenga ayuda médica de inmediato si tiene algún síntoma de reacción alérgica grave, como hinchazón en la cara, los labios, la lengua o la garganta; problemas para respirar o tragar; erupción cutánea grave o picazón intensa; desmayos o sensación de mareo; latidos cardíacos acelerados.
- ◆ **Aumento de la pigmentación de la piel y oscurecimiento de las lesiones cutáneas (lunares o nevos) que ya tiene.** Estos cambios se producen debido a la forma en que actúa IMCIVREE en el cuerpo y desaparecerán cuando deje de usar IMCIVREE. Debe realizarse un examen de piel de cuerpo entero antes de empezar el tratamiento con IMCIVREE y durante este, para detectar cambios en la piel.

Debido a que IMCIVREE se inyecta bajo la piel, la aguja es corta y delgada

- ◆ La aguja para IMCIVREE mide 1 cm de largo.



Para ver las instrucciones ilustradas paso a paso para administrar una inyección IMCIVREE, consulte la **Guía Cómo administrar IMCIVREE**.

La primera vez que le di la inyección, tenía miedo y pensaba que le iba a doler. Pero ahora no le molesta para nada.

— Cuidador de un niño que recibe IMCIVREE



# Comenzando con IMCIVREE



## Cómo decidir sobre IMCIVREE

Usted y su médico deciden si IMCIVREE es un tratamiento adecuado. Si está de acuerdo con IMCIVREE, su médico enviará un formulario de inicio junto con su consentimiento para inscribirse en **Rhythm InTune**. Rhythm InTune es su recurso de apoyo personalizado, lo que incluye ayudarle a comprender la cobertura del seguro y explorar opciones de asistencia económica para pacientes elegibles. **Para obtener más información sobre Rhythm InTune, consulte las páginas 24 y 25.**



## Aprender a inyectar IMCIVREE

Se ofrece capacitación para colocar inyecciones antes de comenzar IMCIVREE. Su médico puede brindar capacitación o coordinarla a través de Rhythm InTune.

## Información importante de seguridad (cont.)


IMCIVREE puede causar efectos secundarios graves, entre ellos, los siguientes:

- ◆ **Toxicidad por alcohol bencílico.** El alcohol bencílico es un conservante en IMCIVREE. El alcohol bencílico puede causar efectos secundarios graves, incluida la muerte, en bebés prematuros y con bajo peso al nacer que han recibido medicamentos que contienen alcohol bencílico. IMCIVREE no se debe usar en bebés prematuros y con bajo peso al nacer.

**IMCIVREE**<sup>®</sup>  
(setmelanotide) injection

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluidas la [Información para el paciente](#) y la **Información importante de seguridad.**





## Cómo comenzar IMCIVREE

IMCIVREE solo está disponible a través de lo que se conoce como farmacia especializada. Rhythm InTune coordinará la entrega de IMCIVREE. Debe comenzar IMCIVREE en su dosis inicial, según las indicaciones de su médico.



## Seguir con IMCIVREE

Su médico lo controlará durante las primeras semanas mientras reciba IMCIVREE. Durante este tiempo, se puede aumentar o disminuir su dosis hasta que alcance la dosis objetivo.

**Rhythm InTune proporciona apoyo personalizado y recursos y programas educativos durante todo el tratamiento para ayudarlo a comenzar y continuar con IMCIVREE.**



## Su fuente de apoyo personalizado

Rhythm InTune es un programa de apoyo diseñado para los cuidadores y las personas con enfermedades genéticas poco frecuentes de obesidad.

### Información importante de seguridad (cont.)

Los efectos secundarios más frecuentes de IMCIVREE incluyen oscurecimiento de la piel, reacciones en el lugar de la inyección, náuseas, dolor de cabeza, diarrea, dolor de estómago, vómitos, depresión y una erección que ocurre sin actividad sexual en hombres.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IMCIVREE. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o a Rhythm Pharmaceuticals al 1-833-789-6337.

**IMCIVREE**<sup>®</sup>  
(setmelanotide) injection

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluidas la [Información para el paciente](#) y la **Información importante de seguridad**.

## ¿Qué puede ofrecerle Rhythm InTune?

Rhythm InTune proporciona recursos, educación e información adaptados a las necesidades específicas de las personas que padecen enfermedades genéticas raras de la obesidad, incluido el SBB.

Rhythm InTune puede ayudar a:



Acceder a recursos educativos



Conectarse con una comunidad



Comprender la cobertura de seguro



Empezar su tratamiento con Rhythm

**Los gerentes de educación para pacientes** son empleados de Rhythm Pharmaceuticals y no proporcionan atención ni asesoramiento médicos. Lo animamos a que hable siempre con su profesional de atención médica en relación con su atención médica.

Si está interesado en hablar con un gerente de Educación del paciente sobre la educación y el apoyo que Rhythm InTune puede ofrecerle a usted o a la persona a su cuidado, puede enviar un correo electrónico o llamarnos a:



[patientsupport@rhythmtx.com](mailto:patientsupport@rhythmtx.com)



1-855-206-0815

# Notas y recordatorios importantes

Este es un espacio para escribir notas o recordatorios importantes para usted mismo o para la persona a su cuidado con SBB. Por ejemplo, cualquier pregunta que desee recordar hacerle a su médico sobre la SBB o IMCIVREE, o cualquier recurso que desee solicitar a Rhythm InTune.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**IMCIVREE es el primer y único tratamiento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratar una vía del MC4R alterada, la causa del hambre y de la obesidad en personas con SBB.**

**¿Desea obtener más información sobre el SBB o IMCIVREE?**

Hable con su médico. Para obtener más información y apoyo, comuníquese con Rhythm InTune:



[patientsupport@rhythmtx.com](mailto:patientsupport@rhythmtx.com)



**1-855-206-0815**

**Información de seguridad importante (continuación)**

**¿Qué es IMCIVREE?**

IMCIVREE es un medicamento con receta que se utiliza en adultos y niños a partir de los 6 años con obesidad debido al síndrome de Bardet-Biedl (SBB) para ayudarlos a perder peso y mantenerlo.

Consulte la [Información de prescripción](#) completa, incluidas la [Información para el paciente](#) y la Información importante de seguridad.

**Rhythm**<sup>®</sup>  
PHARMACEUTICALS

© 2024, Rhythm Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. Rhythm, IMCIVREE y sus logotipos son marcas comerciales de Rhythm Pharmaceuticals, Inc.  
US-SET-2200144 04/2024

Retratos de actores.

